



Para **INFORMAÇÕES SOBRE FLUXO DE ATENDIMENTO DOENÇA RESPIRATÓRIA - COVID 19 E INFLUENZA** acessar:

https://saude.curitiba.pr.gov.br/images/APS/32%20-%20Fluxo_Covid-Influenza_27.05.2024.pdf

<https://saude.curitiba.pr.gov.br/vigilancia/epidemiologica/vigilancia-de-a-a-z/12-vigilancia/566-gripe-ou-influenza.html>

A quimioprofilaxia indiscriminada não é recomendável, pois pode promover o aparecimento de resistência viral.
A medicação não é fornecida para esta finalidade.

OSELTAMIVIR (Tamiflu®)

Indicação: Síndrome gripal de início súbito (febre >38°C + sintomas respiratórios sugestivos de gripe) ou resultado de teste positivo para influenza:

- Pacientes não gestantes ou não hospitalizados quando início dos sintomas há menos de 48 horas.
- Gestantes ou pacientes hospitalizados quando início dos sintomas há menos de 72 horas.

O medicamento **OSELTAMIVIR** pertence ao Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica e é adquirido pelo Ministério da Saúde e distribuído às Secretarias de Estado da Saúde, que por sua vez, distribuem para as Secretarias Municipais da Saúde.

A **apresentação** de **OSELTAMIVIR** disponível nas Unidades de Saúde e UPAs do município de Curitiba é de **75 mg (embalagem com 10 comprimidos)**. Para doses abaixo de 75 mg, ver orientações em:

https://saude.curitiba.pr.gov.br/images/APS/32%20-%20Fluxo_Covid-Influenza_27.05.2024.pdf

O medicamento **Oseltamivir** é fornecido nas **Unidades de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em Curitiba** para o usuário que:

- Possuir cadastro definitivo OU cadastro provisório em Curitiba E
- Apresentar prescrição médica (SUS ou NÃO SUS). O formulário não é obrigatório. **Para prescrições NÃO SUS, é necessária a justificativa** (que pode ser na própria prescrição) contendo a data de início do quadro clínico, sintomas apresentados caracterizando síndrome gripal (presença de três sintomas) OU resultado de teste POSITIVO para influenza.

NIRMATRELVIR + RITONAVIR (Paxlovid®)

Indicação:

- Paciente com idade ≥ 65 anos ou Imunocromprometido com idade ≥ 18 anos
E
- Paciente não grave que não requer uso de oxigênio suplementar
E
- Teste reagente/detectável para SARS-COV-2 (teste antígeno e/ou PCR, não sendo válido autoteste)
E
- Até o 5º dia do início dos sintomas.

Apresentação	Nirmatrelvir 150mg (comprimido rosa) + Ritonavir 100 mg (comprimido branco)
Dose	2 comprimidos de Nirmatrelvir 150mg + 1 comprimido de Ritonavir 100mg *se insuficiência renal moderada (TFG ≥ 30 a < 60mL/min): é necessário ajuste de dose: 1 comprimido de Nirmatrelvir 150mg + 1 comprimido de Ritonavir 100mg *se pessoa vivendo com HIV (PVHIV) em uso de Ritonavir: não é necessário ajuste de dose
Frequência	2 vezes ao dia (12/12 horas)
Período	5 dias

O medicamento **Nirmatrelvir + Ritonavir** é fornecido nas **Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Curitiba** para o usuário que:

- Possui cadastro definitivo OU cadastro provisório em Curitiba.
- Apresente prescrição médica (SUS ou NÃO SUS). O formulário não é obrigatório. **Para prescrições NÃO SUS, é necessária a justificativa** (que pode ser na própria prescrição) contendo data de início dos sintomas, sintomas apresentados e teste positivo/detectável para o SARS-CoV-2.